

en bordure étroite qui s'élargit sur les côtés. Cinquième segment à tache semblable plus petite, indistincte, parfois nulle.

Derniers segments abdominaux bruns en entier. Pubescence usée paraissant claire.

Ventre rougeâtre recouvert d'une pruinosité cendrée, pubescence composée de poils clairs.

Pattes discolores, cuisses brunes à pubescence blanche, tibias plus clairs, assombris à l'apex, tarses noirâtres à pubescence sombre.

Ailes cendrées translucides, presque transparentes à nervation normale.

Balanciers à disques marron, brillants, tige plus claire.

Le *Tabanus pruinosus* se rattache au groupe de *Tabanus variabilis*, *Tabanus atrinanus* et *Tabanus insignis*.

DIPTÈRES NOUVEAUX DU GENRE *TABANUS* RAPPORTÉS DU FOUTA-DJALON
PAR M. CHEVALIER,

PAR M. JACQUES SURCOUF.

***Tabanus sticticolis* nov. sp.**

Type femelle récolté par M. Chevalier dans le Foutadjalon en 1906; 2 autres femelles de la même provenance.

Brunâtre clair, abdomen portant une ligne médiane de triangles clairs et deux lignes latérales de taches imprécises. Ailes cendrées, brunâtres, vers le bord costal. Longueur : 14-15 millimètres.

Tête plus large que le thorax, yeux bruns, sans bandes, glabres. Bande frontale étroite à bords sensiblement parallèles, couverte d'une courte pubescence jaune, portant une callosité brun rougeâtre de la largeur de la bande à la base, de forme semi-ovoïde et surmontée d'une ligne brune sailante, qui s'étend un peu au delà du milieu du vertex.

Antennes d'un testacé brunâtre, premier article à soies jaunâtres, dent du troisième article arrondie. Palpes clairs avec quelques rares poils noirs, courts, à la partie externe.

Epistome jaune, bord postérieur de la tête blanchâtre. Thorax et scutellum bruns, recouverts d'une pruinosité cendrée à pubescence rare et courte composée de poils noirs, flancs ciliés de noir, poitrine blanchâtre avec quelques soies molles blanchâtres.

Abdomen brun marron portant sur chaque segment un triangle médian blanchâtre ayant sa base sur le bord postérieur du segment. En outre, deux bandes latérales blanchâtres, mal délimitées, s'étendent sur chaque côté de l'abdomen, formant une tache qui se relie sur chaque segment à la base du triangle.

Pubescence claire ou noire selon la teinte des zones colorées.

Flancs : Pubescence jaunâtre. Ventre uniformément rougeâtre, courte pubescence blanche, noire à l'apex.

Pattes unicolores brun jaunâtre clair, à pubescence jaunâtre.

Tibias postérieurs frangés: tarsi rembrunis.

Ailes cendrées plus brunes vers le bord costal, non appendiculées.

Balanciers jaune pâle à tige rougeâtre.

Cette espèce est alliée au groupe du *Tabanus bovinus*. Malgré ses dimensions plus restreintes, elle semble établir un passage entre le *Tabanus bovinus* de l'Europe ainsi que du Nord africain, *Tabanus temperatus* (Walkr) du Cap et *Tabanus Madagascariensis* nov. sp. Surcouf de Madagascar.

Tabanus Chevalieri femelle nov. sp.

Type : 1 femelle recueillie dans le Fouta-Djalon par M. Chevalier en 1906.

Une autre femelle de même provenance.

Je dédie cette espèce à M. l'explorateur Chevalier, à qui nous sommes redevables de la découverte de plusieurs espèces intéressantes.

Longueur : 9-10 millimètres.

Gris à teintes neutres.

Tête plus large que le thorax. Yeux glabres brun verdâtre, sans bande ni traits.

Bande frontale large, recouverte d'une courte pubescence cendrée. Callosité basilaire large, brune, convexe au bord postérieur, bisinuée au bord antérieur et prolongée par une tache ovale rejoignant le vertex, qui est dénudé.

Antennes : premier article renflé recouvert d'une pubescence cendrée très courte et de quelques poils noirs assez longs.

2° article très court, 3° article noir dans la partie annelée.

Palpes assez longs, cendrés, avec quelques poils jaune gris au côté externe.

Epistome, partie inférieure et postérieure de la tête de couleur cendrée, glabre.

Thorax brunâtre à pubescence jaune sur le disque.

Pectus rougeâtre. Scutellum brunâtre à pubescence noire.

Abdomen court, élargi, grisâtre, portant une large bande médiane diffuse plus foncée, éclaircie au milieu du bord postérieur de chaque segment et une tache claire triangulaire sur chaque côté. Partie médiane munie d'une longue pubescence noire. Parties latérales à pubescence jaunâtre.

Abdomen grisâtre à pubescence jaune.

Pattes rougeâtres à cuisses concolores recouvertes d'une pubescence jaunâtre peu dense. Tarsi obscurcis.

Ailes transparentes, grises, non appendiculées. Nervures jaune brun, stigma brun très clair, étroit. Cuillerons brunâtres.

Balanciers rougeâtres.

Le *Tabanus Chevalieri* est voisin du groupe qui contient *Tabanus gratus*, *Tabanus sugens* et *Tabanus tritaniatus* nov. sp. Ric et Surcouf.

INSECTES DIPTÈRES NOUVEAUX DU GENRE *TABANUS*
RECUEILLIS DANS L'EST AFRICAIN PAR M. MAURICE DE ROTHSCHILD.

PAR M. JACQUES SURCOUF.

Tabanus Rothschildi femelle nov. sp.

Type : 1 femelle provenant de Voi (Afrique orientale anglaise), prise par M. Maurice de Rothschild en 1906. 2 autres femelles de même provenance.

Étroit et long brun clair avec deux taches rondes, blanches sur chaque segment abdominal. Ailes hyalines.

Longueur du corps, 10 millimètres; de l'aile, 9 millimètres; de l'abdomen, 6 millimètres.

Tête large et d'apparence triangulaire vue de face, yeux bruns, à cornéules égales et glabres. Bande frontale très large, d'un gris jaunâtre, creusée au vertex, portant à la base une callosité transverse, réniforme, d'un brun marron brillant, au-dessus de laquelle se trouve une autre callosité peu distincte, bifide.

Antennes abaissées, testacées à dent très peu saillante. Palpes allongés, jaunâtres, à pubescence rare, assez longue et blanchâtre; quelques poils noirs épars.

Épistome en dessous et partie postérieure de la tête d'un gris cendré clair.

Thorax brun rougeâtre avec trois lignes longitudinales blanches, la médiane abrégée; flancs grisâtres avec quelques longs poils clairs épars.

Abdomen brun clair, allongé, glabrescent.

Chaque segment, étroitement bordé de blanc, porte deux points blancs arrondis; le premier et le deuxième segment ont une fascie médiane blanchâtre.

En outre, le premier segment porte sur le côté une tache blanche, ronde, située à égale distance des bords des segments 2, 3, 4, 5, 6, qui portent sur leur flanc une tache semi-lunaire, blanche, tangente au bord antérieur.

Ventre noir à premier segment recouvert d'une très courte pubescence cendrée, les autres segments sont marqués de blanc et portent chacun deux taches latérales blanchâtres.